

AVERTISSEMENTS AGRICOLES



STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
DIRECTION RÉGIONALE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA FORÊT
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Ancienne Conserverie de CASAMOZZA
LUCCIANA - 20290 - BORGO

Tél. 95.36.05.70



EDITION CORSE

Bulletin Technique N° 186
du 20 Décembre 1990

- : - Traitements d'hiver des arbres fruitiers
- : - Vigne : arrachez et brûlez les souches malades
- : - Scaroles : attention au sclérotinia

ARBRES FRUITIERS

C'est le moment de tailler, cureter les chancres, désinfecter les grosses plaies et traiter si nécessaire.

: Tailler :

- Supprimez en même temps, les rameaux morts ou déformés. (oïdium)
- Brûlez tous les déchets

: Protéger les grosses plaies :

- Appliquer **immédiatement** le produit après la taille en dépassant de 1 à 2 cm le bord de la plaie sur la partie saine de l'écorce.
- Ne jamais mettre de mastic sur les parties pourries des branches et les moignons.
- Renouveler la protection si nécessaire. Cette protection doit en effet être assurée pendant toute la durée de cicatrisation.
- Produits utilisables
 - ** produits à base de goudron dit " de Norvège "
 - ** mastics à cicatrifier. Il contiennent 11,5 % d'huile et 37 % de résines.
 - ** pâtes fluides cupriques

ARBOCHANCRE, CICALAL BAUME, MASTIC ANTICHANCRE

P.1.3.5

11705010-04-88-130
23105177
** baume à base de thiobendazole(1%) + fenfuram (2%)
BAUME PELTON DRAWIPAS S, DRAWIPAS S

** pâtes à base de triadimefon

: Traiter si nécessaire :

Ne pas intervenir systématiquement, mais s'il y a eu dans le verger de gros problèmes d'acariens ou de cochenilles, réaliser les traitements par temps doux, calme et sans risque de gel. Pulvériser abondamment le tronc et les branches sous forte pression et jusqu'à ruissellement.

Produits utilisables :

- huiles jaunes (mélange d'huile minérale + DNOC).
types SEPPIC VERGER, DYTROL 50 ... très énergiques particulièrement sur mousses, lichens vieilles écorces, forts encroutements de cochenilles et acariens.

- colorants nitrés ou DNOC.
type SANDOLINE A liquide, NITRICIDE trifocide ... même action que ci-dessus mais moins décapantes. Ils peuvent être employés jusqu'au débourrement notamment contre les psylles du poirier.

- huiles minérales de pétrole

* d'hiver, type PEST OIL 7
* d'hiver et de printemps, types OVIPRON, OLIOCIN, EUPHYTANE
66 doses variables suivant les dates d'utilisation, utilisables jusqu'au débourrement.
Respecter scrupuleusement les dosages suivant les espèces et les dates d'application.

VIGNE

La lutte contre l'**esca**, **eutypiose** commence par des mesures prophylactiques : évitez les grosses plaies de taille. Si ces plaies sont nécessaires, protégez les avec un fongicide.
Arrachez et brûlez les souches malades.//

SCAROLES

On assiste actuellement à des attaques importantes de **sclérotinia** sur scaroles à l'approche de la cueillette. Les dégâts se manifestent par un flétrissement brutal de la plante et la décomposition du collet en pourriture. La plante s'arrache facilement. On peut observer la présence de filaments blancs et de petits grains noirs et durs : "les sclérotés". Ces sclérotés permettent la conservation du champignon qui pourra infecter les cultures suivantes.

Il convient : - d'éliminer les plantes atteintes
- d'effectuer une rotation des cultures pour éviter la recontamination.

On peut également appliquer en préventif un anti-botrytis (iprodione, vinchlozoline, procymidone) mais attention les délais avant récolte sont de **15 à 21 jours** selon les spécialités. Ces produits ont par ailleurs une efficacité moyenne sur le sclérotinia.




bonu
natale
a
tutti

VITICULTEURS, ATTENTION! - VITICULTEURS, ATTENTION! - VITICULTEURS, ATTENTION!

NETTOYEZ VOS PARCELLES ET LES ALENTOURS SUPPRIMEZ...

Les tas de bois mort



Les ceps ou morceaux de ceps morts
laissés sur le sol ou dans les rangs



Les parties mortes ou malades
sur les ceps



- 1 cm³ de bois peut libérer, après une pluie, 1 milliard de spores en 24 heures
- 1 m³ d'air peut contenir 1 million de spores
- les spores libérées peuvent contaminer les ceps non protégés en pénétrant par les plaies de taille

...ET BRÛLEZ!



La lutte contre l'eutypiose, c'est aussi :

- la protection immédiate des plaies de taille, dès la taille de formation, avec un fongicide efficace;
- la pratique du recépage dès la manifestation de symptômes (nécessité de marquer les pieds atteints, au printemps précédent)



GROUPE DE TRAVAIL NATIONAL EUTYPIOSE

- Institut National de la Recherche Agronomique
- Services Régionaux de la Protection des Végétaux
- Institut Technique du Vin
- Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Montpellier
- Comités Interprofessionnels
- Syndicats Viticoles des Régions Viticoles
- Union Nationale des Coopératives d'Approvisionnement Agricole

REALISATION

Ministère de l'Agriculture et de la Forêt
Direction Générale de l'Alimentation
Sous-Direction de la Protection des Végétaux

175, rue du Chevaleret
75646 PARIS Cedex 13
Tél. 45.84.13.13 – Fax 45.70.81.69

1990 Imoges contre engraisson

Photos : S. Fabrigoule, S.D.P.V. Paris, P. Retaud, S.P.V. Cognac

Lutter contre l'Eutypiose de la vigne oui, c'est possible...



**en détruisant le bois mort
où se conserve le champignon**

GROUPE DE TRAVAIL NATIONAL EUTYPIOSE